Πληροφορίες Προϊόντος. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά!

Instillagel® Almed

Υδροχλωρική λιδοκαϊνη 2%, διγλυκονική χλωρεξιδίνη 0,05%
Αποστειρωμένο λιπαντικό με υποστηρικτικές ιδιότητες τοπικής αναισθησίας και απολύμανσης.

Περιέχει: Υδροχλωρική λιδοκαϊνη 2%, διγλυκονική χλωρεξιδίνη 0,05%, Μεθυλο-4-υδροξυβενζοϊκό, Προπυλενογλυκόλη, Υδροξυαιθυλική κυτταρίνη, Υδροξείδιο του νατρίου.

Θεραπευτικές ενδείξεις: Λιπαντικό με υποστηρικτικές ιδιότητες τοπικής αναισθησίας και απολύμανσης για τη διευκόλυνση της εισαγωγής καθετήρων και εργαλείων.

Ιδιότητες: Το Instillagel® Almed συγκολλάται καλά στους βλεννογόνο και δεν εμποδίζει τους φακούς και τα όργανα. Το Instillagel® Almed είναι στείρο .

Ανεπιθύμητες ενέργειες: Σε σπάνιες περιπτώσεις μπορεί να παρουσιαστούν αλλεργικές αντιδράσεις (ερεθισμοί δέρματος, στις πιο σοβαρές περιπτώσεις αναφυλακτικό σοκ) σε ένα από τα συστατικά στοιχεία.

Αντενδείξεις: Το Instillagel® Almed δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις υπερευαισθησίας στην υδροχλωρική λιδοκαΐνη, χλωρεξιδίνη, αλκυλο-4-υδροξυβενοζοϊκό (παραβένες) ή σε κάποιο από τα έκδοχα.

Κύηση και γαλουχία: Η λιδοκαΐνη πρέπει να χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια της κύησης μόνο εάν είναι απολύτως απαραίτητο. Η λιδοκαΐνη διαπερνά τον πλακουντιακό φραγμό γρήγορα. Η λιδοκαΐνη μπορεί να προκαλέσει καταστολή του Κ.Ν.Σ. και συνεπώς μια μείωση στη βαθμολογία Apgar σε νεογνά με υψηλές συγκεντρώσεις πλάσματος. Η λιδοκαΐνη απεκκρίνεται σε μικρές ποσότητες στο ανθρώπινο μητρικό γάλα.

Υπόδειξη: Σε τραύματα με σοβαρή αιμορραγία ενδέχεται να παρουσιαστούν παρενέργειες λόγω πιθανής απορρόφησης λιδοκαίνης σε πολύ σπάνιες περιπτώσεις. Τα απαραίτητα θεραπευτικά μέτρα εναπόκεινται στην κρίση του ιατρού.

Δοσολογία: Εκτός εάν συνταγογραφείται διαφορετικά, α) σε διαδικασία που περιλαμβάνει τη χρήση μήλης στην ουρήθρα και καθετηριασμό: ενσταλάξτε 5 ή 10 ml. Μετά το συνήθη καθαρισμό της βαλάνου και του εξωτερικού στομίου της ουρήθρας, το Instillagel® Almed ενσταλάζεται αργά στην ουρήθρα και η βάλανος συμπιέζεται β) στην κυστεοσκόπηση: Για την ανώδυνη εισαγωγή των οργάνων, ολόκληρη η ουρήθρα συμπεριλαμβανομένου του εξωτερικού σφιγκτήρα πρέπει να επαλειφθεί με το λιπαντικό. Αυτό απαιτεί την ενστάλαξη 5 ή 10 ml, και σε ορισμένες περιπτώσεις μια επιπλέον ποσότητα 5 ή 10 ml. Μια σφιγκτήρας πέους τοποθετείται στην περιοχή της στεφανιαίας αύλακας.

Συμβουλές και πληροφορίες για τη σταθερότητα: Το Instillagel® Almed δεν πρέπει να χρησιμοποιείται μετά την ημερομηνία λήξης! Απορρίψτε τα υπολείμματα του ζελ και μην χρησιμοποιήσετε την κενή σύριγγα για άλλο σκοπό, προκειμένου να αποφευχθεί η μεταφορά μικροβίων.

Φυλάσσετε σε μέρος που δε το βλέπουν και δεν το φθάνουν τα παιδιά!
Συσκευασίες των 5 και 25 συριγγών μιας χρήσεως που περιέχουν 5 / 10 ml.

Τελευταία ενημέρωση πληροφοριών: Μάρτιος 2012